

Parodontitis stadium		Stadium I	Stadium II	Stadium III	Stadium IV
Ernst	Interdentaal CAL op plaatsen van grootste verlies	1 tot 2 mm	3 tot 4 mm	≥5mm	≥5mm
	Röntgenologisch botverlies	Coronale 1/3 (< 15%)	Coronale 1/3 (15% to 33%)	Uitgebreid tot midden of apicale 1/3 van wortellengte	Uitgebreid tot midden of apicale 1/3 van wortellengte
	Element verlies	Geen tandverlies a.g.v. parodontitis		tandverlies a.g.v. parodontitis van ≤ 4 elementen	tandverlies a.g.v. parodontitis van ≥ 5 elementen
Complexiteit	Lokaal	Maximale pocketdiepte ≤ 4 mm  Vooral horizontaal botverlies	Maximale pocketdiepte ≤ 5 mm  Vooral horizontaal botverlies	In aanvulling op stadium II complexiteit:  Pocketdiepte ≥ 6 mm  Verticaal botverlies ≥ 3 mm  Furcatie klasse II of III  Matig kaakvormdefect	In aanvulling op stadium II complexiteit:  Noodzaak voor complex rehabilitatie vanwege: - Kauwfunctiestoornis - Secundair occlusaal trauma (mobiliteit ≥ 2) - Ernstig kaakvormdefect - Beethoogteverlies, verschuiving / uitwaaiering - Minder dan 20 gebitselementen (10 occlusale eenheden)
Omvang en verspreiding	Voeg als beschrijving toe aan stadium	Voor elk stadium, geef de omvang aan als lokaal (< 30% betrokken elementen), gegeneraliseerd, of molaar/incisief patroon			

Parodontitis graad			Graad A: Langzame progressie	Graad B: Matige progressie	Graad C: Snelle progressie
Primaire criteria	Direct bewijs van progressie	Longitudinale data (röntgenologisch botverlies of klinisch aanhechtingsverlies)	Bewijs van geen verlies afgelopen 5 jaren	< 2 mm afgelopen 5 jaren	≥ 2 mm afgelopen 5 jaren
	Indirect bewijs progressie	% botverlies/leeftijd	< 0,25	0,25 tot 1,0	> 1,0
		Fenotype	Grote hoeveelheid plaque met weinig afbraak	Afbraak in overeenstemming met hoeveelheid biofilm	Afbraak ernstiger dan te verwachten o.b.v. hoeveelheid biofilm; specifiek klinisch patroon suggestief voor periodes van snelle progressie en/of vroege start aandoening (b.v. molaar/incisief patroon; therapierespons voldoet niet aan verwachting)
Modificerende factor	Risico factoren	Roken	Niet-roker	Roker < 10 sigaretten/dag	Roker ≥ 10 sigaretten/dag
		Diabetes	Normoglycemisch / geen diagnose van diabetes	HbA1c < 7% in patiënten met diabetes	HbA1c ≥ 7% in patiënten met diabetes
Risico van systemische impact van parodontitis	Ontstekingslast <i>Inflammatory burden</i>	High sensitive CRP (hcCRP)	< 1 mg/L	1 tot 3 mg/L	> 3 mg/L
Biomarkers	Indicatoren van CAL/botverlies	Speeksel, gingival crevicular fluid, serum	?	?	?