

Initiële diagnostiek en indicatiestelling preventieve verwijdering derde molaar bij verschillende leeftijdscategorieën

17 jaar

Beoordeel aanwezigheid, positie en angulatie M3i m.b.v. intra-orale foto

Geïmpacteerde M3i met mesiale of horizontale angulatie

Geen M3i aanwezig óf geïmpacteerde M3i met verticale of distale angulatie

Schat in of verwijdering M3i in eigen beheer kan worden uitgevoerd

Ja

Nee

Verwijs naar operateur die verwijdering M3i kan uitvoeren

Operateur maakt panoramische röntgenopname om M3 en omringende structuren in beeld te brengen

Bot rondom de kroon partieel of gedeeltelijk afwezig en geen verwachting van normale eruptie

Volledig in bot geïmpacteerde M3 óf verwachting van normale eruptie

Indicatie preventieve verwijdering M3i, bij voorkeur vóór de leeftijd van 18 jaar, én beoordeel indicatie preventieve verwijdering M3s (zie 18-30 jaar)

Geen preventieve verwijdering, monitoring

18-30 jaar

M3i

Beoordeel M3i

1. Partieel geërupteerde M3i (distale, verticale, mesiale of horizontale angulatie)
2. Geïmpacteerde M3i, met mesiale of horizontale angulatie waarbij:
- bot rondom de kroon partieel of volledig afwezig is en/of
- verdiepte pocket M2d

1. Volledig in het bot geïmpacteerde M3i
2. Volledig geërupteerde M3i, functioneel, goede reiniging mogelijk
(3. Vanwege preventie van crowding, cysten, tumoren)

Indicatie preventieve verwijdering M3i én beoordeel indicatie preventieve verwijdering M3s

Geen preventieve verwijdering M3i, monitoring

M3s

Beoordeel M3s

1. Afunctionele M3s, met name indien mondhygiëne (naar verwachting) bemoeilijkt wordt
2. Geïmpacteerde M3s, met mesiale of horizontale angulatie waarbij:
- bot rondom de kroon partieel of volledig afwezig is en/of
- verdiepte pocket M2d

1. Hoog geïmpacteerde M3s
2. Volledig geërupteerde M3i, functioneel, goede reiniging mogelijk
(3. Vanwege preventie van crowding, cysten, tumoren)

Indicatie preventieve verwijdering M3s, bij voorkeur in dezelfde zitting als M3i

Geen preventieve verwijdering M3s, monitoring

> 30 jaar

Geen preventieve verwijdering M3, monitoring

Vervolgdiagnostiek, behandeling en nazorg extractie derde molaar

Beoordeel panoramische röntgenopname (zie flowchart initiële diagnostiek) op tekenen van verhoogd risico op NAI schade: Volledige overlap radices met canalis mandibularis, of overlap in combinatie met een of meerdere van onderstaande tekenen op de panoramische röntgenopname:

- Donkere radices ter plaatse van de overlap en/of
- Onderbreking radiopake lijn canalis mandibularis en/of
- Deviatie canalis mandibularis

Aanwijzingen voor verhoogd risico

Geen aanwijzingen voor verhoogd risico

Schat in of verwijdering M3i in eigen beheer kan worden uitgevoerd

Ja

Nee

Verwijs naar operateur die verwijdering M3 kan uitvoeren

Operateur overweegt CBCT voor accurate risico-inschatting (zie aanbevelingen hoofdstuk 3)

Bevestiging van verhoogd risico

Geen verhoogd risico

Coronectomie

Met zorg volledig verwijderen

Nazorg

- Preoperatief (30 sec.) en postoperatief (7 dagen) spoelen met chloorhexidine
- Geef niet routinematig antibiotica