

Basisset Noodmedicatie Tandartspraktijk

Geneesmiddel in kit	Indicatie	Dosis	Kinderen
Glyceryl Trinitraat Spray 1 flesje 400microgram/dosis	Angina pectoris Dreigend infarct	1 – 3 sprays sublinguaal	Nvt
Adrenaline 1:1000 1 Pen	Anafylaxie (1e)	2x shot (a 0,3ml) i.m. zn na 5 min herhalen	5-12 jr 1x shot > 12 jr 2x shot
Clemastine 1mg/ml 1 ampul 2ml	Anafylaxie (2e) quincke-oedeem	1 ampul i.m.	1-12 jr ½ ampul i.m. > 12 jr 1 ampul i.m.
Hydrocortison 50mg/ml 1 ampul 2ml	Anafylaxie (3e)	1 ampul i.m.	Idem
Salbutamol 1 Inhaler 100 microgram/dosis	Asthma aanval	1-2 puffs inhaleren zn herhalen	Idem
Midazolam 5 mg/ml 2 Ampullen a 1ml	Status Epilepticus Convulsie > 5 minuten of snel opeenvolgende convulsies	2 ampullen i.m.	1-5 jr 1 ampul 5-10 jr 1½ ampul > 10 jr 2 ampullen
Diazepam 5mg/ml 2 Ampullen a 2 ml	Status Epilepticus Als alternatief ipv Midazolam	2 ampullen i.m.	1-3 jr 1 ampul > 3 jr 2 ampullen
Limonade siroop (40-60 mg / 100 ml)	Hypoglycemie (bij diabetes) Kan slikken	1 glas 1:1 verdund	Idem
Glucagon 1mg/ml 1wegwerpspuit 1 ml	Hypoglycemie (bij diabetes) Kan niet meer slikken	1 spuit i.m.	< 8 jr ½ spuit > 8 jr 1 spuit

3 Injectienaalden 0,8 X 35-40 mm (groen)

3 injectiespuitjes (2-2,5 cc)

 1 Noodtracheotomieset bv Portex Mini Trach

© RJJ van Es 2012