

Extramurale mondzorg tijdens en na kankerbehandeling

Voor alle patiënten tijdens en na kankerbehandeling – preventieve aspecten		Aandachtspunten bij mondzorgbehandeling	
<p>Adequate zelfzorg is essentieel om klachten en schade aan het gebit en mondslimvlies door de behandeling van kanker te voorkomen of te beperken.</p>	<p>Geef patiënten voedingsadvies en houd daarbij rekening met eventuele problemen bij het eten – schakel zo nodig een gespecialiseerde diëtist in</p>	<p>Voer geen electieve behandelingen uit als dit qua bloedwaarden en mondconditie van de patiënt niet verantwoord is. Stel de behandeling dan liever uit.</p>	<p>Bij spoedbehandelingen in de mond: overleg altijd met de behandelend specialist of antibiotica- of trombocytenprofylaxe nodig is. Verwijs als dat nodig is en probeer klachten of symptomen tijdelijk te verlichten als behandeling moet worden uitgesteld.</p>
<p>Als er sprake is van actieve cariës of een verhoogd risico daarop, neem dan extra fluoridemaatregelen.</p>	<p>Bij een gevoelig mondslimvlies door gewone tandpasta: adviseer een fluoridetandpasta zonder SLS of menthol.</p>	<p>Let op het verhoogde risico op MRONJ bij botmanipulatie en drukplekken, vooral bij risicopatiënten.</p>	<p>Houd bij gebruik van prednison rekening met mogelijke bijnierschorsinsufficiëntie en volg zo nodig het stressprotocol.</p>
<p>Bij een droge mond (hyposalivatie of xerostomie): raadpleeg de adviezen uit de KIMO-richtlijn over medicatie en het gebruik van meerdere medicijnen tegelijk (polyfarmacie).</p>			